

Cuestionario – Urgencias: Quemaduras, Intoxicaciones y Alergias

1. ¿Cuál es la prioridad inicial en un paciente con quemaduras extensas y compromiso de vía aérea?
 - a) Cubrir las lesiones con gasas estériles
 - b) Administrar líquidos intravenosos
 - c) Asegurar la permeabilidad de la vía aérea
 - d) Aplicar pomadas tópicas
2. En quemaduras de segundo grado, la característica clínica más frecuente es:
 - a) Escara seca y negra
 - b) Ampollas con contenido claro
 - c) Piel blanquecina e insensible
 - d) Eritema leve y sin dolor
3. ¿Cuál de las siguientes NO es una medida inmediata recomendada en quemaduras químicas?
 - a) Retirar la ropa contaminada
 - b) Lavar con abundante agua
 - c) Neutralizar el químico con una sustancia opuesta
 - d) Evitar frotar la piel
4. En la fórmula de Parkland para reposición de líquidos, la mitad del volumen calculado se administra en:
 - a) Primeras 8 horas
 - b) Primeras 4 horas
 - c) Primeras 12 horas
 - d) Primeras 24 horas
5. Ante una intoxicación por organofosforados, el antídoto específico es:
 - a) Naloxona
 - b) Atropina
 - c) Flumazenilo
 - d) N-acetilcisteína
6. En una intoxicación por paracetamol, la sustancia de elección para prevenir daño hepático es:
 - a) Carbón activado
 - b) N-acetilcisteína
 - c) Atropina
 - d) Pralidoxima
7. ¿Cuál es el primer paso en el manejo de un paciente inconsciente por intoxicación desconocida?
 - a) Administrar carbón activado
 - b) Garantizar la vía aérea y soporte vital básico

- c) Inducir el vómito
- d) Administrar líquidos endovenosos

8. En anafilaxia, el medicamento de elección y vía de administración inicial es:

- a) Hidrocortisona IV
- b) Adrenalina intramuscular
- c) Antihistamínico oral
- d) Salbutamol inhalado

9. ¿Cuál es el signo que más debe alertar sobre compromiso grave en una reacción alérgica?

- a) Eritema localizado
- b) Urticaria en extremidades
- c) Edema de glotis
- d) Prurito leve

10. Tras la administración de adrenalina en anafilaxia, se debe:

- a) Dar de alta inmediatamente
- b) Mantener observación mínima de 4-6 horas
- c) Administrar inmediatamente corticoides orales
- d) Suspender toda monitorización

Clave de respuestas

- 1. c
- 2. b
- 3. c
- 4. a
- 5. b
- 6. b
- 7. b
- 8. b
- 9. c
- 10. b